

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE	
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	1	Trattamento dell'ipertiroidismo secondario in pazienti affetti da insufficienza renale in stadio terminale in terapia dialitica di mantenimento	Trattamento dell'ipercalcemia indotta da ipertiroidismo secondario in pazienti portatori di trapianto renale	Cinacalcet	MIMPARA		Mod.648		Endocrinologia Nefrologia e Dialisi Oncologia	
DPC					Cinacalcet	MIMPARA					
PHT		2	Ipogonadismo ipogonadotropo, pubertà precoce		Paracalcitolo	ZEMPLAR	36	SI	SI	Endocrinologia - Urologia - Andrologia - Pediatrica	
DPC		3	Criptorchismo monolaterale e bilaterale		Gonadorelina	KRYPTOCUR					Endocrinologia Ginecologia Ostetricia Oncologia
DPC		4	Infertilità maschile e femminile		Menotropina	MENOGON- MEROPUR	74	SI - AIFA	SI	Centri per la cura dell'infertilità di cui all'ordinanza ministeriale 5.3.1997 Endocrinologia Ginecologia Urologia	
					Urofollitropina	FOSTIMON					
					Follitropina Alfa	GONAL F					
					Follitropina Beta	PUREGON					
					Corigonadotropina alfa	OVITRELLE					
					Corifollitropina alfa	ELONVA					
Lutropina alfa	LUVERIS										
					Follitropina Alfa/ Lutropina alfa	PERGOVERIS					
DPC		5	Neutropenia		Filgrastim (R-Methug-Csf)	RATIOGASTRIM- ZARZIO (BIOSIMILARE)- GRANULOKINE	Ex30	SI - AIFA	SI	Ematologia Immunologia clinica e allergologia Malattie infettive Oncologia Radioterapia	
					Pegfilgrastim	NEULASTA					
					Lenograstim (R-Hug-Csf)	MYELOSTIM-GRANOCYTE 34					
PHT		6	Prevenzione della tossicità a carico del tratto urinario in pazienti trattati con ifosfamide e ciclofosfamide		Mesna	UROMITEXAN	PRODOTTO REVOCATO			Ematologia Oncologia	
DPC		7	Carcinoma della prostata, della mammella, endometriosi, fibroma ut., pubertà precoce.		Buserelina	SUPREFACT	51	SI	SI	Centri con competenze auxologiche Endocrinologia Endocr. Pediatrica Ginecologia-Ostetricia Oncologia Radioter. oncologica Urologia	
					Leuprorelina	ENANTONE- ELIGARD					
					Goserelina	ZOLADEX					
					Triptorelina	DECAPEPTYL-GONAPEPTYL					
			Treatmento di pazienti maschi adulti con tumore della prostata ormonodipendente in stadio avanzato		Degarelix	FIRMAGON		SI		Endocrinologia Oncologia Radioterapia oncologica Urologia	
Fascia A-DPC			Carcinoma della prostata		Flutamide	FLUTAMIDE					
					Bicalutamide	CASODEX-BICALUTAMIDE-SAFEDEX (GENERICO)					
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	7	Acromegalia .Trattamento dei sintomi clinici dei tumori carcinoidi, endocrini, gastroenteropancreatici	Diarrea secretoria refrattaria da sindrome dell'intestino corto e da pregressi interventi chirurgici sullo stomaco; Ipotensione ortostatica grave in disfunzioni generalizzate del Sistema Nervoso Vegetativo; Fistole pancreatiche Angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica	Octreotide	LONGASTATINA - SANDOSTATINA - SAMILSTIN - OCTREOTIDE (GENERICO)		Mod.648		Endocrinologia Oncologia Gastroenterologia	
DPC					Octreotide	LONGASTATINA - SANDOSTATINA - SAMILSTIN - OCTREOTIDE (GENERICO)	40	SI - AIFA	SI		
					Lanreotide	IPSTYL					
PHT					Trattamento sintomatico del carcinoma corticosurrenalico avanzato (non resecabile, metastatico o recidivo).	Sindrome Cushing grave (trattata con terapia radiante o in preparazione all'intervento chirurgico)	Mitotano	LYSODREN			SI
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96							Mod.648			

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
PHT		8	Il medicinale e' indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon retto in combinazione con calcio folinato.		Tagafur/Uracile	UFT	PRODOTTO REVOCATO			Oncologia-Medicina interna
			Capecitabina		XELODA	SI				
			Sodio Ibandronato Monoidrato		BONDRONAT	SI	Medicina Interna - Ortopedia - Oncologia			
PHT		9	Trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non e' considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea.		Topotecan Cloridrato	HYCAMTIN		SI		Oncologia
			Carcinoma polmonare non a piccole cellule. Carcinoma mammario metastatico.		Vinorelbina Bitartrato	NAVELBINE				Oncologia - Medicina Interna - Ematologia
PHT		10	Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) della linea B in pazienti con sufficiente riserva midollare.		Fludarabina Fosfato	FLUDARA		SI		Oncologia - Medicina Interna - Ematologia
DPC		11	Trattamento topico dei condilomi acuminati di genitali esterni e pianali.Carcinomi bas.sup.AK non ipertrofiche		Imiquimod	ALDARA		SI	SI	Dermatologia Ginecologia Oncologia
PHT	Inibisce la crescita delle cellule leucemiche. E' anche indicato per il trattamento dei tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni		Imatinib Mesilato		GLIVEC	Oncologia - Medicina Interna - Ematologia				
	Nel trattamento delle manifestazioni cutanee nei pazienti con linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) di grado avanzato, refrattari ad almeno un trattamento sistemico precedente.		Bexarotene		TARGETIN					
	E' indicato nel trattamento di pazienti con: glioblastoma multiforme di prima diagnosi in concomitanza a radioterapia (RT) e in seguito come monoterapia glioma maligno, quale il glioblastoma multiforme o l'astrocitoma anaplastico, che manifestino recidiva o progressione dopo la terapia standard.		Temozolomide		TEMODAL				Oncologia - Medicina Interna	
DPC		12	Morbo di Alzheimer di grado lieve-moderato		Donepezil	MEMAC	85	SI - AIFA	SI	U.V.A - Neurologia - Geriatria - Psichiatria
					Rivastigmina	EXELON-PROMETAX				
					Memantina	EBIXA				
					Galantanmina	REMYNIL				
DPC		13	Trattamento dei pazienti con morbo di Parkinson che presentano flutt. motorie giornaliere di fine dose che non sono stabilizzati con il trattamento a base levodopa/inibitori della DDC		Levodopa/carbidopa/entacapone	STALEVO		SI	SI	Geriatria Neurologia
PHT		13	E' indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa)nei pazienti con fluttuazioni di fine dose		Rasagilina Mesilato	AZILECT		SI		Geriatria Neurologia
DPC		13	Morbo di Parkinson in pazienti che presentano fluttuazioni motorie giornaliere di fine dose		Entacapone	COMTAN		SI - AIFA	SI	Geriatria Neurologia
			Morbo di Parkinson		Tolcapone	TASMAR		SI		
DPC		14	Trattamento di pazienti con acromegalia, che non hanno risposto in modo adeguato ad intervento chirurgico e/o a radioterapia, e per i quali un' appropriata terapia farmacologica con analoghi della somatostatina si e' dimostrata inefficace nel normalizzare le concentrazioni di IGF-1 o e' risultata non tollerata.		Somatropina	GENOTROPIN - HUMANOTROPE - NORDITROPIN - NUTROPINE - OMNITROPE - SAIZEN - ZOMACTON	39	SI	SI	Centri regionali individuati per il trattamento del deficit di GH (DD.G.R n. 111 del 12/12/89; n. 23-27768 del 12/07/99; n. 60-7737 del 18/11/02,n.14-5609 del 02/04/07)
DPC		15	Narcolessia .Sindrome da ipopnea		Modafinil	PROVIGIL		SI	SI	Neurologia Neuropsichiatria

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
DPC		16	Prevenzione di Episodi Tromboembolici Venosi (TEV) in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore o dopo intervento di chirurgia generale maggiore.		Dalteparina Enoxaparina Nadroparina Parnaparina Reviparna Bemiparina	FRAGMIN CLEXANE SELEPARINA FLUXUM CLIVARINA IVOR		SI		Ortopedia
DPC		16	Prevenzione di Episodi Tromboembolici Venosi (TEV) in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore. Prevenzione degli Episodi Tromboembolici Venosi (TEV) in pazienti sottoposti a chirurgia addominale, quali pazienti sottoposti a chirurgia addominale per patologie tumorali. Prevenzione degli Episodi Tromboembolici Venosi (TEV) in pazienti di pertinenza medica considerati ad alto rischio di TEV e che sono immobilizzati a causa di una patologia acuta quale insufficienza cardiaca e/o disturbi respiratori acuti e/o infezioni o patologie infiammatorie acute. Trattamento dell'angina instabile o dell'infarto del miocardio senza sopra-slivellamento del tratto ST (UA/NSTEMI) in pazienti nei quali un approccio invasivo urgente (PCI) (<120 minuti) non e' indicato. Trattamento dell'infarto del miocardio associato a sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI) in pazienti che sono in terapia con trombolitici o che, inizialmente, non sono deputati a ricevere altre forme di terapia di riperfusione.		Fondaparinux	ARIXTRA				
DPC		16	Infarto miocardico (da alcuni giorni fino a meno di 35 giorni), ictus ischemico (da 7 gg fino a meno di 6 mesi) o arteriopatia periferica accertata. - Sindrome coronarica acuta senza elevazione del segmento ST (angina instabile o infarto miocardico senza onda Q), inclusi quei pazienti che devono sottoporsi al posizionamento di uno stent con un intervento coronarico percutaneo, in combinazione con acido acetilsalicilico (ASA). - Infarto miocardico acuto con elevazione del segmento ST, in combinazione con ASA nei pazienti in trattamento medico idonei ad una terapia trombolitica. Pazienti affetti da inf.mioc. art.perif.documentata,sindrome coron.acuta senza innalz.del tratto ST		Clopidogrel	PLAVIX -CLOPIDROGREL GENERICO				Cardiologia-Neurochirurgia
Fascia A-DPC		16	Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onde Q), inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo Sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica		Clopidogrel / Acido Acetilsalicilico	DUOPLAVIN				Cardiologia
DPC		16	Prevenzione di eventi ischemici su base aterotrombotica, in pazienti affetti da sindrome coronarica acuta, infarto del miocardio o sottoposti ad intervento coronarico percutaneo primario o ritardato.		Prasugrel	EFIENT		SI	SI	Cardiologia
DPC		16	In co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con Sindrome Coronarica Acuta (angina instabile, infarto miocardico senza innalzamento del tratto ST [NSTEMI] o infarto miocardico con innalzamento del tratto ST [STEMI]), compresi i pazienti trattati farmacologicamente e quelli sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) o a impianto di by-pass aorto-coronarico (CABG)		Ticagrelor	BRILIQUE		SI	SI	Cardiologia Cardiochirurgia Chirurgia vascolare Geriatría Medicina interna Medicina d'urgenza
PHT		16	Il medicinale e' indicato per la riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti a rischio con trombocitemia essenziale (TE), i quali mostrano intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa essere ridotta a un livello accettabile con l'attuale terapia		Anagrelide	XAGRID		SI		Ematologia-Medicina interna

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
DPC		17	Prevenzione episodi trombo embolici venosi negli adulti a seguito di un'operazione di sostituzione dell'anca o del ginocchio.	Prevenzione di ictus e di embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più dei seguenti fattori di rischio: 1) precedente ictus, attacco ischemico transitorio o embolia sistemica; 2) frazione di eiezione del ventricolo sinistro minore del 40%; 3) insufficienza cardiaca sintomatica, maggiore oppure uguale a Classe 2 della classificazione della NYHA; 4) età >= 75 anni; 5) età >=65 anni associata con una delle seguenti condizioni: diabete mellito, coronaropatia o ipertensione.	Apixaban	ELIQUIS		RNRL		Ematologia-Ortopedia-Medicina interna- Anestesiologia-Neurologia-Cardiologia
					Dabigatran etexilato	PRADAXA 75mg		SI		
						PRADAXA 110mg / 150mg				
Rivaroxaban	XARELTO									
DPC		18	Psicosi grave:pazienti seguiti da servizi psichiatrici ed igiene mentale.Schizofrenia		Clozapina	LEPONEX-CLOZAPINA			SI	Dipartimenti salute mentale Geriatría Neurologia Neuropsichiatria infantile Psichiatria Sert con competenze psichiatriche U.V.A. (per il trattamento dei disturbi non cognitivi dei pazienti dementi)
					Paliperidone	INVEGA				
					Olanzapina	ZYPREXA- OLANZAPINA GENERICO				
					Quetiapina	SEROQUEL- QUETIAPINA GENERICO				
					Risperidone	RISPERDAL- RISPERIDONE GENERICO				
					Aripiprazolo	ABILIFY				
Ziprasidone	ZELDOX									
DPC		18	Trattamento di episodi maniacali da moderati a severi associati a disturbo bipolare		Asenapina	SYCREST		SI		Dipartimenti salute mentale Neurologia Psichiatria
DPC		19	Sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei pazienti con un'elevata attività di malattia nonostante la terapia con interferone-beta.		Fingolimod	GILENYA		SI		Neurologia
PHT	Pazienti che hanno manifestato un eprimo episodio clinico ben definito e che sono considerati essere ad alto rischio di sviluppare sclerosi multipla clinicamente definita. Indicato per ridurre la frequenza delle recidive in pazienti deambulanti affetti da sclerosi multipla recidivante, con fasi di remissione.			Glatiramer acetato	COPAXONE	65	SI		Neurologia	
PHT		20	E' indicato per prolungare la vita o posticipare il ricorso alla ventilazione assistita dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica SLA		Riluzolo	RILUTEK		SI		Medicina interna-Neurologia
DPC		21	Profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti riceventi trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto resistente al trattamento con altri prodotti medicinali immunosoppressivi.		Tacrolimus	PROGRAF- TACNI		SI	SI	Centri trapianti Gastroenterologia Nefrologia
DPC		21	Profilassi antirigetto del trapianto allogenico di fegato – rene - cuore		Tacrolimus	ADVAGRAF				
PHT		21	Trattamento della dermatite atopica, da moderata a grave negli adulti che non rispondono adeguatamente o che sono intolleranti alle terapie convenzionali quali i corticosteroidi topici. Trattamento della dermatite atopica, da moderata a grave nei bambini (dai 2 anni di età in poi) che non hanno risposto alle terapie convenzionali quali i corticosteroidi topici. Trattamento di mantenimento della dermatite atopica da moderata a severa per la prevenzione delle riacutizzazioni e per il prolungamento degli intervalli liberi da esacerbazioni in pazienti con riacutizzazioni molto frequenti (4 o più volte l'anno) che abbiano manifestato una risposta iniziale a un trattamento di un massimo di 6 settimane con tacrolimus unguento due volte al giorno .		Tacrolimus uso topico	PROTOPIC			RRL	SI
DPC		21	Profilassi antirigetto del trapianto allogenico di rene o cuore		Everolimus	CERTICAN		SI		Centri trapianti Gastroenterologia Nefrologia
DPC		21	Profilassi antirigetto del trapianto allogenico di rene		Sirolimus	RAPAMUNE				
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	21	Profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapiantorenale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi	Malattia "trapianto verso ospite", nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di 1^ e 2^ linea, dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche	Micofenolato Mofetile	CELLCEPT-MYFENAX-MICOFENOLATO GENERICO		Mod.648		Pediatria-Immunologia -Medicina interna-Ematologia
PHT	Micofenolato Mofetile				CELLCEPT-MYFENAX-MICOFENOLATO GENERICO		SI			
PHT	Micofenolato Sodico				MYFORTIC					
PHT		22	Trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica con una capacità vitale forzata (CVF) superiore al 40% di quella prevista e con più di 5 anni di età.		Dornase alfa	PULMOZYME				Cardiologia - Pneumologia - Medicina interna - Gastroenterologia
PHT		22	Terapia di lungo periodo dell'infezione polmonare cronica dovuta a Pseudomonas aeruginosa nei pazienti di età non inferiore ai 6 anni affetti da fibrosi cistica (FC). Deve essere tenuta in considerazione la linea guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.		TOBRAMICINA	BRAMITOB-TOBI		SI		Medicina interna - Infettivologia - Pneumologia - Pediatria

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
DPC		23	Terapia agg. per il trattamento di adulti e bambini di età pari o superiore a 4 anni portatori di sindrome di Lennox-Gastaut e che siano refrattari a tutti gli altri medicinali antiepilettici		Felbamato	TALOXIA				Pediatria - Neurologia - Neuropsichiatria
DPC		24	Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con normale ritmo sinusale che abbiano una controindicazione o un'intolleranza ai beta-bloccanti		Ivabradina	CORLENTOR-PROCORALAN		SI	SI	Allergologia Geriatría Medicina interna Pneumologia
DPC		24	Terapia aggiuntiva nel trattamento sintomatico dei pazienti con angina pectoris stabile non adeguatamente controllati con le terapie antianginose di prima linea, come i betabloccanti e/o i calcioantagonisti, o che non le tollerano.		Ranolazina	RANEXA		SI	SI	Cardiologia Geriatría Medicina interna
DPC		25	Inf vir. da VZV,HSV, HS recidivante, CMV in trapianti d'organo		Valaciclovir	TALAVIR- ZELITREX	84			
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	25	Retinite da CMV Prevenzione malattie da CMV in pazienti CMV negativi	Trattamento 'preemptive' dell'infezione da CMV in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche	Valganciclovir	VALCYTE- DARILIN		Mod.648		
DPC					Valganciclovir	VALCYTE- DARILIN		SI	SI	
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	25	Epatite cronica B Malattia epatica scompensata, e al.	Profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto fegato, in pazienti HBV-DNA positivi prima del trapianto, in associazione con Ig G specifiche; Profilassi della riattivazione dell'epatite B in portatori inattivi di HBsAg in corso di terapia immunosoppressiva e di soggetti HBsAg-negativi e anti-HBc positivi candidati a terapie fortemente immunosoppressive, in quanto a rischio significativo di epatite B occulta passibile di riattivazione; Profilassi dell'epatite B in riceventi di trapianto epatico da donatori HBsAg negativi e anti-HBc positivi	Lamivudina	ZEFFIX- LAMIVUDINA GENERICO		Mod.648		Centri trapianti Malattie infettive-Oncologia
		25			Lamivudina	ZEFFIX- LAMIVUDINA GENERICO		SI - AIFA	SI	
DPC		25			Interferone Alfa Naturale	ALFAFERONE	Ex 32	SI - AIFA	SI	Centri trapianti di fegato Malattie infettive-Dermatologia- Dermatologia-Ematologia- Gastroenterologia-Immunologia- Nefrologia-Oncologia
	Interferone Alfa 2a				ROFERON-A					
	Interferone Alfa 2b				INTRON-A					
	PegInterferone Alfa 2b				PEG-INTRON					
					PegInterferone Alfa 2a	PEGASYS				
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	25	Epatite cronica C. Epatite cronica B. Neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico. Neoplasie solide. Condilomi acuminati	1) L'interferone alfa ricombinante (IFN alfa-2a, 2b) è usato nel trattamento della trombocitemia essenziale in pazienti per i quali non è possibile adottare le terapie farmacologiche disponibili sul mercato; in questo gruppo rientrano anche pazienti in gravidanza (farmaco erogabile dal SSN ai sensi della legge 648/96) (Determinazione AIFA, 2007; GU, 2007); 2) l'interferone alfa ricombinante (IFN alfa-2a, 2b) è utilizzato nel trattamento delle forme refrattarie della malattia di Behcet (farmaco erogabile dal SSN ai sensi della legge 648/96) (GU, 1997 e 1999a); 3) l'interferone alfa ricombinante (IFN alfa-2a, 2b) può essere impiegato nel trattamento dell'epatite C acuta (farmaco erogabile dal SSN ai sensi della legge 648/96) (GU, 2009); 4) l'interferone alfa ricombinante (IFN alfa-2a, 2b) può essere impiegato nel trattamento di particolari angiomi che per la loro posizione o dimensione compromettono il corretto funzionamento di strutture vitali o provocano complicanze con rischio per la vita (farmaco erogabile dal SSN ai sensi della legge 648/96) (GU, 1997 e 1999); 5) l'interferone alfa-2b ricombinante p	Interferone Alfa 2b	INTRON-A		Mod.648		Centri trapianti di fegato Malattie infettive-Dermatologia- Dermatologia-Ematologia- Gastroenterologia-Immunologia- Nefrologia-Oncologia
PHT		25	Pazienti con diagnosi di sclerosi multipla recidivante (SM). Negli studi clinici questa era caratterizzata da due o piu' esacerbazioni acute (recidive) nei tre anni precedenti senza evidenza di una continua progressione tra le recidive; il farmaco rallenta la progressione dell'invalidita' e diminuisce la frequenza delle recidive. >>Pazienti con un singolo evento demielinizzante con un processo infiammatorio in fase attiva, se tale evento e' di gravita' tale da rendere necessario il trattamento con corticosteroidi per via endovenosa, se sono state escluse altre diagnosi e se e' stato accertato che i pazienti sono ad alto rischio di sviluppare una sclerosi multipla clinicamente definita. Deve essere interrotto nei pazienti che sviluppano SM progressiva		Interferone Beta 1a	AVONEX - REBIF	65	SI		Neurologia
				Interferone Beta 1b	EXTAVIA					

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
PHT		25	E' indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in adulti con malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi. Questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi, pazienti mai trattati prima con nucleosidici e pazienti con epatite B resistenti alla lamivudina.		Entecavir	BARACLUDE		SI		Malattie infettive-Medicina interna Gastroenterologia
PHT		25	Trattamento di bronchioliti virali gravi da virus sinciziale respiratorio nei primi giorni di infezione		Ribavirina	VIRAZOLE		SI		
			Trattamento dell'epatite cronica C, anche in pazienti adulti con cirrosi compensata; uso esclusivo in associazione con peginterferone alfa-2a o con interferone alfa-2a. Non deve essere usato in monoterapia. L'associazione con peginterferone alfa-2a e' indicata anche in pazienti che presentano una co-infezione da HIV clinicamente stabile, compresi i pazienti con cirrosi compensata. I regimi di associazione sono indicati in pazienti non trattati in precedenza nonche' in pazienti con recidiva dopo interruzione della terapia con interferone alfa.			COPEGUS		SI		
			Trattamento dell'epatite cronica C utilizzato esclusivo in terapia combinata con peginterferone alfa-2b (adulti) o interferone alfa-2b (adulti, bambini (3 anni o piu' di eta') e adolescenti). Non deve essere utilizzato in monoterapia. L'associazione con peginterferone alfa-2b e' indicata anche in pazienti adulti che presentano una co-infezione da HIV clinicamente stabile. I regimi di associazione sono indicati in pazienti non trattati in precedenza, nonche' in pazienti adulti non responder a trattamento in monoterapia con interferone alfa o in associazione con ribavirina, in caso di recidiva dopo interruzione della terapia con interferone alfa.			REBETOL- RIBAVIRIN(generico)		SI		
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96	25		Terapia della recidiva da HCV in pazienti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C, in combinazione con interferone alfa ricombinante o pegilato o in monoterapia se esistono controindicazioni o intolleranza agli interferoni; Terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni pegilati, nei pazienti con	Ribavirina	VIRAZOLE COPEGUS REBETOL- RIBAVIRIN(generico)		Mod.648		Malattie infettive-Medicina interna Gastroenterologia
PHT		25	E' indicato per il trattamento dell'epatite cronica B in pazienti adulti con malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale, con livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi.		Telbivudina	SEBIVO		SI		Malattie infettive-Medicina interna Gastroenterologia
PHT		25	Trattamento dell'epatite C cronica da genotipo 1 in associazione con altri due medicinali: peginterferone alfa e ribavirina, in pazienti con malattia epatica compensata che non sono stati trattati in precedenza o che non hanno risposto a una precedente terapia		Boceprevir	VICTRELIS		RNRL		
PHT		25	Trattamento dell'epatite C cronica in associazione con altri due medicinali, peginterferone alfa e ribavirina. Il medicinale è utilizzato nei pazienti adulti con epatopatia compensata, compresa la cirrosi, che non sono mai stati trattati in precedenza o che sono stati precedentemente trattati con interferone alfa.		Telaprevir	INCIVO		RNRL		
PHT		25	Trattamento dell'epatite cronica B negli adulti con: epatopatia compensata con evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati di alanina aminotransferasi (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e fibrosi epatica; epatopatia scompensata.		Adefovir dipivoxil	HEPSERA		SI		Malattie infettive-Medicina interna Gastroenterologia
PHT		25	Terapia di mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti immunocompromessi, inclusi quelli affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), in cui la retinite stessa risulti stabilizzata dopo appropriata terapia iniziale; per la prevenzione delle infezioni da CMV, in pazienti HIV-sieropositivi a rischio di sviluppare una patologia da CMV e in pazienti trapiantati d'organo.		Ganciclovir	CITOVIRAX		SI		Malattie infettive-Medicina interna Gastroenterologia
PHT		25	Polmonite da Pneumocystis carinii in pazienti debilitati o immunodepressi, come ad esempio in caso di AIDS. La pentamidina isetonata è in particolare utile nei pazienti allergici ai sulfamidici e nei casi di intolleranza o resistenza al co-trimoxazolo. Leishmaniosi (viscerale e cutanea) compresi i casi resistenti alla terapia con composti pentavalenti dell'antimonio. Tripanosomiasi africana: malattia del sonno da Trypanosoma gambiense.		Pentamidina	PENTACARINAT		SI		Centri trapianti Malattie infettive

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
PHT		26	Viene utilizzato per il trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Aspergillus, Scedosporium, Fusarium e Candida.		Voriconazolo	VFEND		SI		Medicina Interna - Infettivologia - Ematologia
PHT		26	Aspergillosi invasiva in pazienti intolleranti o con malattia resistente ad amfotericina B o ad itraconazolo; fusariosi in pazienti intolleranti o con malattia resistente ad amfotericina B ; cromoblastomicosi e micetoma in pazienti intolleranti o con malattia resistente a itraconazolo ; coccidioomicosi in pazienti intolleranti o con malattia resistente ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo; candidiasi orofaringea, come terapia di prima linea in pazienti con malattia grave o immunocompromessi, con aspettativa di scarsa risposta ad una terapia topica		Posaconazolo	NOXAFIL		SI		Malattie infettive Medicina interna Ematologia
DPC		27	Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura. Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura.		Teriparatide	FORSTEO	79	SI		Endocrinologia e Malattie Ricambio Medicina malattie metaboliche dell'osso Recupero e rieducazione funzionale Reumatologia
DPC		27	Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad aumentato rischio		Denosumab	PROLIA		SI		Medicina Interna - Ortopedia - Reumatologia - Fisiatria - Geriatria - Endocrinologia
DPC		28	Alternativa all'amiodarone per la Prevenzione di una recidiva di fibrillazione atriale. Per diminuire la frequenza di risposta ventricolare in corso di FA non permanente		Dronedarone	MULTAQ		SI	SI	Cardiologia Cardiologia Medicina d'urgenza
PHT		29	Anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale		Metosipolietilenglicole-Epoetina Beta	MIRCERA	Ex12	SI - AIFA	SI	Anestesia-Chirurgia Ematologia Medicina trasfusionale Medicina Interna Nefrologia-Oncologia Pediatria
				Epoetina Alfa	EPREX- BINOCRIT(BIOSIMILARE)					
				Epoetina Beta	NEORECORMON					
				Epoetina theta	BIOPOIN- EPORATIO					
				Epoetina Zeta	RETACRIT					
PHT			Malattie neoplastiche.Terapie di supporto.Anemie gravi		Metosipolietilenglicole-Epoetina Beta	MIRCERA	Ex12	SI - AIFA	SI	
				Epoetina theta	BIOPOIN- EPORATIO					
				Epoetina Alfa	EPREX- BINOCRIT(BIOSIMILARE)					
				Epoetina Beta	NEORECORMON					
				Epoetina Zeta	RETACRIT					
DPC		Sindromi mielodisplastiche (MDS);Anemia refrattaria (AR), con sideroblasti (RARS) e senza sideroblasti (RA)		Epoetina Alfa	EPREX		Mod.648			
			Epoetina Beta	NEORECORMON						
PHT		30	Trattamento dell'iperammonemia dovuta alla deficienza di N-acetilglutammato sintasi		Acido carginico	CARBAGLU		SI		Medicina Interna - Pediatria - Neurologia
PHT		31	Trattamento di pazienti con ipertensione polmonare primaria classificata come III classe funzionale NYHA, per il miglioramento della capacita' fisica e dei sintomi		ILOPROST	VENTAVIS		SI		Cardiologia - Pneumologia - Reumatologia - Dermatologia
DISTR.TERR.	LEGGE 648/96				Trattamento dell'ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica (IPCTE) inoperabile mediante intervento chirurgico di Endoarteriectomia Polmonare (EAP), IPCTE persistente dopo intervento chirurgico di EAP inefficace o recidiva di IPCTE dopo intervento chirurgico di EAP efficace ma non ripetibile	Bosentan Monoidrato	TRACLEER		Mod.648	
					Bosentan Monoidrato	TRACLEER	SI			
					AMBRISENTAN	VOLIBRIS				
					Tadalafil	ADCIRCA - CIALIS				
					Vardenafil	Levitra				
				Sildenafil	VIAGRA					
				SITAXENTAN SODICO	THELIN					
				SILDENAFIL CITRATO	REVATIO					
PHT		32	Trattamento aggiuntivo dell'omocistinuria, che comporta deficit o difetti di: cistationina beta-sintasi (CBS); 5,10-metilentetraidrofolato reductasi (MTHFR); metabolismo del cofattore cobalamina (cbl)		BETAINA	CYSTADANE		SI		Medicina interna- Pediatria- Epatologia -Nefrologia

Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
PHT		33	Trattamento sostitutivo nella dipendenza da oppioidi		Naltrexone cloridrato	ANTAXONE,NALOREX		SI		SERT
					BUPRENORFINA/NALOXONE	SUBOXONE				
PHT		34	Malattie da accumulo di ferro o alluminio		Deferoxamina	DEFERAL		SI		Ematologia
			Trattamento dell'accumulo di ferro nei pazienti affetti da talassemia maggiore, per i quali la terapia con la deferoxamina e' controindicata.		DEFERASIROX	EXJADE				
					DEFERIPRONE	FERRIPROX				
PHT		35	Polmonite nosocomiale		LINEZOLID	ZYVOXID		SI		Malattie infettive - Medicina interna - Ematologia
PHT		36	E' indicato per il trattamento della cistinosi nefropatica manifesta		MERCAPTAMINA BITARTRATO	CYSTAGON		SI		Pediatria-Nefrologia
PHT		37	Per la malattia i Gaucher di tipo 1 con sintomatologia da lieve a moderata. Puo' solo essere utilizzato per il trattamento di pazienti per i quali la terapia di sostituzione enzimatica non e' appropriata		Miglustat	ZAVESCA		SI		Pediatria-Neurologia -Medicina interna-
PHT		38	Emofilia A lieve e moderata - Malattia di von Willebrand di tipo I; preparazione ad interventi chirurgici di pazienti emofilici e con malattia di von Willebrand; preparazione di pazienti uremici (con allungamento del tempo di emorragia) a manovre invasive.		Desmopressina	EMOSINT		SI		Ematologia - Immunoematologia - Servizi trasfusionali e di immunoematologia
PHT		38	Trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da Emofilia B		Fattore VIII di coagulazione naturale e ricombinante, Fattore IX di coagulazione naturale e ricombinante C1-inibitore, Complesso protrombinico umano, Complesso protrombinico antiemofilico umano, Desmopressina,	BENEFIX-ADVATE-HELIXATE-KOGENATE-REFACTO-ALPHAFENATE-UMAN COMPLEX-FEIBA-PROVERTIN-NONAFAC		SI		Ematologia Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale
DPC		39	Diabete		Glimepiride+pioglitazone	TANDEMACT		SI - AIFA		Malattie metaboliche e diabetologia
					Exenatide	BYETTA				
					Saxagliptin	ONGLYZA				
					Sitagliptin	JANUVIA - XELEVIA - TESAVEL				
					Sitagliptin+metformina	EFFICIB-VELMETIA- JANUMET				
					Liraglutide	VICTOZA		SI		
					Rosiglitazone+glimepiride	AVAGLIM				
					Insulina glargine	LANTUS				
					Insulina Detemir	LEVEMIR				
					Pioglitazone + Metformina	COMPETACT				
					Vildagliptin/Metformina	EUCREAS		SI - AIFA		
					Vildagliptin	GALVUS				
					Pioglitazone	ACTOS				
PHT		40	Trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di un programma di trattamento multimodale		Metilfenidato	RITALIN		SI		Neuropsichiatria Infantile - Pediatria - MMG
DPC			Trattamento del Disturbo da Deficit dell'attenzione e Iperattività (ADHD)		Atomoxetina	STRATTERA		SI - AIFA	SI	
PHT		41	Profilassi della immunizzazione anti-D (Rho) in donne Rh negative (Rho, d) e in donne Du positive		Immunoglobulina umana anti-D (Rh)	IMMONORHO-IGAMAD-PARTOBULIN		SI	SI	Ematologia Servizi di Immunoematologia e Trasfusionale Ginecologia e ostetricia
DPC		42	Iperfosfatemia in pazienti affetti da insufficienza renale cronica emodializzati o in dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD).		Lantanio carbonato	FOZNOL		SI	SI	Nefrologia e Dialisi
			Iperfosfatemia in dializzati		Sevelamer	RENAGEL- RENVELA				
PHT		43	Trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva, come farmaco antireumatico in grado di modificare il decorso della malattia (DMARD - Disease-Modifying Antirheumatic Drug), artrite psoriasica attiva		Leflunomide	ARAVA-LEFLUNOMIDE(Generico)		SI	SI	Riabilitazione Reumatologica Ortopedeutica
DPC		44	Carenza primaria e secondaria di carnitina		Levocarnitina	CARNITENE	8	SI	SI	Nefrologia e Dialisi



Canale	LEGGE 648/96	Ordine	PATOLOGIA	Indicazione Terapeutica	PRINCIPIO ATTIVO	FARMACO	NOTA	P.T	L.I.T	PRESCRITTORE
PHT		45	Kuvan è indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in pazienti adulti e pediatrici al di sopra dei 4 anni di età affetti da fenilchetonuria (PKU) che hanno mostrato una risposta a tale trattamento		SAPROPTERINA DICLORIDRATO	KUVAN		SI		Pediatria - Neuropsichiatria Infantile - Endocrinologia
PHT		46	Terapia adiuvante nel trattamento di lunga durata dei disturbi del ciclo dell'urea, compresa la carenza della sintetasi carbamilfosfatica, della transcarbamilasi dell'ornitina o della sintetasi arginino-succinica. Per tutti i pazienti con comparsa neonatale (mancanza totale di enzimi, che si manifesta nei primi 28 giorni di vita). Pazienti con manifestazione tardiva della malattia (carenza enzimatica parziale, che si presenta dopo il primo mese di vita) e che hanno una storia di encefalopatia iperammonemica.		SODIO FENILBUTIRRATO	AMMONAPS		SI		Medicina Interna - Pediatria - Neurologia
PHT		47	Blocca l'assorbimento del rame dall'intestino, prevenendone il trasferimento nel sangue e il successivo accumulo nel corpo. Il rame non assorbito viene quindi eliminato nelle feci. Il morbo di Wilson persiste per tutta la vita del paziente e per questo è necessario proseguire il trattamento per tutta la vita.		ZINCO ACETATO	WILZIN		SI		Medicina Interna - Pediatria - Epatologia - Neurologia - Neuropsichiatria
DPC		48	Terapia di mantenimento nella BPCO associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore		Roflumilast	DAXAS		SI		Allergologia Geriatría Medicina interna Pneumologia
PHT		49	Per il mantenimento dell'astinenza nel paziente alcolodipendente		Acamprosato	CAMPRAL		SI		SERT
PHT		50	Riduzione della sintomatologia da ipofunzione della ghiandola salivare in pazienti con xerostomia grave dopo irradiazione per neoplasie cervico-cefaliche. Trattamento della sintomatologia da secchezza della bocca e da secchezza della congiuntiva nei pazienti affetti dalla sindrome di Sjogren.		PILOCARPINA CLORIDRATO	SALAGEN		SI		Oncologia-Oculistica Medicina interna - Gastroenterologia
PHT		51	Terapia di seconda linea in pazienti intolleranti ai farmaci non derivati dall'ergotamina o che non abbiano risposto a tale terapia, sia in monoterapia che in associazione alla levodopa in combinazione con un inibitore periferico della decarbossilasi.		Cabergolina	CABASER		solo per l'indicazione Morbo di Parkinson validità max del PT: 6 mesi		Geriatría Neurologia Neuropsichiatria Psichiatria
Fascia A-DPC		52	Prevenzione dell'epatite B in caso di esp.acc.in sogg. Non immunizzati. Immunoprofilassi dell'epatite B in pazienti in emodialisi		Immunoglobulina epatitica B	IGANTIBE 1000UI/5ml IMMUNOHBS IM ZUTECTRA SC 55IR 1ML 500UI				